



COW&GATE FOLLOW-on milk from 6 months 700 grams

Приготування та використання

Інструкція для годування малюків віком від 6 місяців: приблизно на 1 пляшку суміші:

кількість мірних ложок на одне годування (1 ложка = 4,7г), кількість води: 210 мл.

Коли відлучення від грудей налагоджено, ми рекомендуємо давати дитині 500-600 мл на день.

Це лише інструкція, вашій дитині може знадобитися більше або менше, ніж зазначено вище. Зверніться до медичного фахівця за додатковою порадою.

Завжди використовуйте мірну ложку, що входить до комплекту. Колір ложки час від часу може змінюватися.

Готувати кожну дозу згідно з інструкцією.

- З міркувань гігієни не зберігайте готові корми, викидайте незакінчені корми якомога швидше і завжди протягом 2 годин.
- Не розігрівати в мікрохвильовій печі, гарячі краплі можуть спричинити тяжкі опіки.
- Ніколи не додавайте зайві ложки або щось інше до годування дитини.
- Ніколи не залишайте дитину одну під час годування.

Як використовувати упаковку: щоб відкрити, зніміть смужку та підніміть кришку.

В складі цієї упаковки є мірна ложка, зберігайте її всередині кришки.

Міцно закрийте кришку.

Як приготувати молоко для дитини: оскільки сухе молоко не є стерильним, недотримання інструкцій може призвести до захворювання дитини.

1. Вимийте руки та стерилізуйте весь посуд відповідно до інструкцій виробника.
2. Закип'ятіть 1 літр свіжої води. Залиште чайник охолонути на 30 хвилин і не більше. Відміряйте необхідну кількість води (див. Дозування вище) у стерилізовану пляшку для суміші. Остерігайтеся опіків. Не використовуйте штучно пом'якшену або багаторазово кип'ячену воду.
3. За допомогою ложки, що входить в комплект, розрівняйте порошок за допомогою вбудованого вирівнювача. Не притискайте порошок.
4. Додайте правильну порцію порошку у воду (1 мірна ложка на 30 мл = 1 унція води). Додавання занадто великої або малої кількості ложок може бути шкідливим. Помістіть стерилізовану кришку на пляшку і негайно, вертикально та потрясіть пляшку протягом щонайменше 10 секунд, поки порошок повністю не розчиниться.
5. Охолодіть під холодною водою. Перевірте температуру готової суміші! Годувати негайно.

Preparation and Usage

Feeding guide 6-12 months

Approx. 1 beaker, No. of level scoops per feed (1 scoop = 4.7g): 7, Quantity of water per feed: 210ml, 7fl.oz

Once weaning is established, we recommend giving your baby 500-600ml per day. This is only a guide, your baby may need more or less than the above. Ask your healthcare professional if you require more advice. Always use the scoop provided. Scoop colour may change from time to time.

Make up each feed as required.

- For hygiene reasons, do not store made-up feeds, discard unfinished feeds as soon as possible, and always within 2 hours.
- Do not heat in a microwave, hot spots may occur and cause scalding.
- Never add extra scoops or anything else to your baby's feeds.
- Never leave your baby alone during feeding.

How to use this pack

To open, remove the strip and lift the lid.

A scoop is provided in this pack, please store inside the lid.

Click the lid securely shut.

How to prepare your baby's milk

Because powdered milks are not sterile, failure to follow instructions may make your baby ill.

1 Wash hands and sterilise all utensils according to manufacturers' instructions.

2 Boil 1 litre of freshly run water. Leave kettle to cool for 30 minutes and no longer. Measure the required amount of water (refer to feeding guide) into a sterilised beaker. Be careful of scalding. Do not use artificially softened or repeatedly boiled water.

3 Using the scoop provided, level off the powder with the built-in leveller. Do not press/heap the powder.

4 Add the correct measure of powder to the water (1 scoop to 30ml / 1 fl.oz of water). Adding too many or too few scoops can be harmful. Place the sterilised lid on the beaker and shake immediately, vertically and vigorously for at least 10 seconds, until the powder is dissolved.

5 Cool under running tap. Check temperature of feed. Feed immediately.