



СМА ЛІТЛ СТЕПС СУХА СУМІШ ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ ВІКОМ ВІД МІСЯЦІВ, 800 грамів банка

Приготування та використання

Інструкція з годування від 6+ місяців

1 порція = 200 мл: 1 склянка/пляшка, кількість охолодженої, щойно кип'яченої води: 180 мл, 6 ф. унцій (приблизно), кількість ложок порошку: 6

Усі діти різні, але намагайтеся, щоб від 6 місяців до 1 року ваша дитина отримувала 500-600 мл LITTLE STEPS® Follow-on Milk на день, як напій, так і на кашах або в суміші з їжею. Змішайте 1 ложку порошку з 30 мл (приблизно 1 унції) води.

прибл. 177 ложок на банку. 1 ложка = 4,5 г. прибл. 29 порцій по 200 мл на банку.

Як відкрити та приготувати корм для дитини

Незважаючи на те, що цей продукт виготовлений у суворих гігієнічних умовах, він не є стерильним. Недотримання інструкцій щодо приготування та зберігання може зашкодити здоров'ю дитини.

1 Потягніть запобіжний ущільнювач і відкрийте кришку. Мірна ложка передбачена під кришкою. Підніміть язичок на фользі, обережно та безпечно зніміть пломбу та утилізуйте її.

2 Добре вимийте руки. Вимийте та стерилізуйте весь посуд відповідно до інструкцій виробника.

3 Закип'ятіть 1 літр свіжої водопровідної води. Дати охолонути кип'яченій воді не більше 30 хвилин. Відміряйте 180 мл (приблизно 6 унцій) води в склянку або пляшку, обережно – вода гаряча. Не використовуйте штучно пом'якшену або багаторазово кип'ячену воду.

4 Використовуючи лише ложку, що входить до комплекту, додайте 6 ложок порошку, розрівнюючи кожную ложку тильною стороною чистого сухого ножа. Зберігайте мірну ложку у суспензії всередині банки та замініть кришку.

5 Накрийте склянку кришкою або соску і кришку на пляшку і добре струсіть, поки порошок повністю не розчиниться. Охолодіть склянку/пляшку під холодною проточною водою або в мисці чи глечичку з холодною водою, поки вона не стане теплою, не занурюйте кришку/соску. Перевірте температуру, струснувши кілька крапель на внутрішню сторону зап'ястя.

Важлива інформація про годування

- Не додавайте додатковий порошок або воду, щоб зробити корм сильнішим або слабшим, і не вдавляйте порошок у ложку. Використання занадто великої чи малої кількості порошку може захворіти вашій дитині.
- За потреби ми рекомендуємо готувати кожную дозу в окремих склянках/пляшках.
- З гігієнічних міркувань викиньте незакінчену суміш у пляшці якомога швидше.
- Готові суміші можна додавати в каші та змішувати з їжею.
- Не змінюйте та не додавайте до сумішей, якщо це не зазначено за медичними показаннями.
- Не розігрівайте суміш в мікрохвильовій печі, це може призвести до появи гарячих точок і спричинити опіки.
- Пам'ятайте, що коров'яче молоко не можна вживати як напій протягом першого року.

SMA LITTLE STEPS follow-on milk 6+ months 800 grams can

Preparation and Usage

Feeding Guide from 6+ Months

1 Serving = 200 ml: 1 beaker/bottle, Amount of Cooled, Freshly Boiled Water: 180 ml, 6 fl. oz. (approx.), Number of Scoops of Powder: 6

All babies are different but try to ensure that from 6 months to 1 year your baby has 500 - 600 ml of LITTLE STEPS® Follow-on Milk per day, either as a drink, on cereals or mixed with food. Mix 1 scoop of powder to 30 ml (approx. 1 fl. oz.) of water.

Approx. 177 scoops per can. 1 scoop = 4.5 g. Approx. 29 x 200 ml servings per can.

How to Open and Prepare Your Baby's Feed

Whilst this product is made under strict hygienic conditions, it is not sterile. Failure to follow instructions on preparation and storage may make your baby ill.

1 Pull the safety seal and open the lid. The scoop is provided under the lid. Lift the tab pull on the foil seal, carefully and safely remove the seal and dispose of it.

2 Wash hands well. Wash and sterilise all utensils according to manufacturers' instructions.

3 Boil 1 litre of fresh tap water. Allow boiled water to cool for no more than 30 minutes. Measure 180 ml (approx. 6 fl. oz.) of water into a beaker or bottle, carefully - the water is hot. Do not use artificially softened or repeatedly boiled water.

4 Using only the scoop provided, add 6 scoops of powder, levelling off each scoop with the back of a clean dry knife. Store the scoop in suspension inside the can and replace lid.

5 Place a lid on the beaker, or teat and cap on the bottle and shake well until powder is fully dissolved. Cool beaker/bottle under cold running water or in a bowl or jug of cold water until lukewarm, do not immerse the lid/teat. Test temperature by shaking a few drops onto the inside of your wrist.

Important Feeding Information

- Do not add extra powder or water to make feeds stronger or weaker and do not press powder into scoop. Using too much or too little powder can make your baby ill.
- We recommend preparing each feed in individual beakers/bottles when required.
- For hygienic reasons, discard unfinished feed in the beaker/bottle as soon as possible.
- Made-up formulae can be poured over cereals and mixed with food.
- Do not alter or add to formulae unless medically directed.
- Do not warm feeds in microwave, hot spots may occur and cause scalding.
- Remember, cows' milk should not be used as a drink during the first year.